

FAMILLE	TAILLE				CERQUES		AILES			Caractères distinctifs et couleurs approximatives au niveau de l'espèce	
	Très petit <5mm	Petit 5 à 10	Moyen 10 à 15	Grand >15 mm	Nombre		Nombre 4 ou 2	Nervuration, Couleur		Yeux en turban des mâles et couleurs	Couleur du corps ou marques particulières
					3	2		Ailes avant	Ailes arrière		
OLIGONEURIDAE			X		3		4	Très peu nervurées (< 6 nervures)	Très peu nervurées (< 6 nervures)	-----	Olive
<i>Oligoneuriella rhenana</i>			X		3		4			-----	
POLYMITARCYIDAE			X		3		4	Nervuration très dense, Laiteuses	Nervuration très dense, Laiteuses	-----	Crème ("Manne blanche")
<i>Ephoron</i>			X		3		4			-----	
<i>Ephoron virgata</i>			X		3		4			-----	
EPHEMERIDAE				X	3		4	Jaunâtres +taches brunes		-----	Taches larges, brunes aux derniers tergites Taches en virgules aux derniers tergites
<i>Ephemerid</i>				X	3		4			-----	
<i>Ephemerid</i>				X	3		4			-----	
CAENIDAE	X				3		2) Ailes horizontales et 1 seul rang de nervures transversales	-----	-----	Olive clair
<i>Caenis horaria</i>	X				3		2			-----	
EPHEMERELLIDAE		X			3		4	1 seul intercalaire sur bord de fuite	Petites, triangulaires, très nervurées	-----	Brun olive à rouge -orange Marron à bordeaux
<i>Serratella ignita</i>		X			3		4			-----	
LEPTOPHEBEIDAE			X		3		4	Pas d'intercalaire au bord de fuite	Petites, triangulaires, très nervurées	-----	
<i>Leptophlebia</i>			X		3		4			-----	
BAETIDAE		X				2	4	2 intercalaires au bord de fuite	Minuscules, ovales, rares nervures	SEULEMENT LES BAETIDES MALES	
<i>Baetis</i>		X				2	4			-----	
<i>Baetis rhodani</i>		X				2	4			Turban marron, cerclage gris-brun	Olive foncé
<i>Alainites multicauda</i>		X				2	4			Turban marron, cerclage olive	Olive foncé
<i>Nigrobaetis nigra</i>		X				2	4			Turban marron, cerclage ocre	Thorax brun sombre, tergites opalines
<i>Baetis fuscatus</i>		X				2	4			Turban jaune vif	Jaunâtre
<i>Baetis scambus</i>		X				2	4			Turban brun, cerclage jaunâtre	Olive
<i>Baetis alpinus</i>		X				2	4			Turban brun, cerclage olive	Brun clair
<i>Centroptilum</i>		X				2	4			-----	
<i>Centroptilum luteolum</i>		X				2	4	1 seul intercalaire sur bord de fuite	Minuscules, ovales, 1 "éperon"	Turban orange, cerclage olive	Jaunâtre
<i>Cloeon/Procloeon</i>		X				2	4	1 seul intercalaire sur bord de fuite	-----	Turban orange, cerclage olive	Brun
<i>Cloeon dipterum</i>		X				2	4			-----	
HEPTAGENIIDAE			X			2	4	Riche nervuration	Moyennes, triangulaires, très nervurées	-----	
<i>Ecdyonurus</i>			X			2	4			-----	
<i>Ecdyonurus venosus</i>			X			2	4			-----	Brun rouge
<i>Ecdyonurus forcipatus</i>			X			2	4			-----	Brun
<i>Epeorus</i>			X			2	4			-----	
<i>Epeorus sylvicola</i> (assimilé)			X			2	4			-----	Jaunâtre, zébrures brunes obliques
<i>Heptagenia</i>			X			2	4			-----	
<i>Heptagenia sulphurea</i>			X			2	4			-----	Olive clair
<i>Rhithrogena</i>			X			2	4			-----	
<i>Rhithrogena semicolorata</i>			X			2	4			-----	Brun
SIPHONURIDAE			X			2	4	Nervuration très dense	Nervuration très dense	-----	Brun clair à brun foncé
<i>Siphonurus</i>			X			2	4			-----	
POTAMANTHIDAE			X		3		4	Jaunâtres sans mouchetures	Jaune clair	-----	Jaunâtre
<i>Potamantia</i>			X		3		4			-----	

Pour mémoire: Familles AMETROPODIDAE, ISONYCHIDAE

Conception, réalisation Paul LE GALL